

Examen national : Mathématiques

Session de rattrapage 2022 (épreuve officielle RS 22F)

Durée : 3 heures. L'usage de la calculatrice non programmable est autorisé. La qualité de la rédaction et la précision des justifications sont prises en compte dans la notation.

L'épreuve est composée de quatre exercices et un problème indépendants entre eux. Le candidat peut traiter les exercices suivant l'ordre qui lui convient ; l'utilisation de la couleur rouge est à éviter. Barème : 2,5 + 3 + 3 + 3 + 8,5 points. $\ln$ désigne la fonction logarithme népérien.

Suites numériques

Exercice 1 (2.5 points). Soit (u_n) la suite numérique définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \frac{\sqrt{2}}{2}u_n + \frac{2-\sqrt{2}}{2}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

- Montrer que pour tout n de $\mathbb{N}$, $u_n > 1$. (0,5 pt)
 - Montrer que pour tout n de $\mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n = \frac{\sqrt{2}-2}{2}(u_n - 1)$ et déduire que la suite (u_n) est décroissante et convergente. (0,75 pt)
- On pose pour tout n de $\mathbb{N}$, $v_n = u_n - 1$.
 - Montrer que (v_n) est une suite géométrique et déterminer sa raison et son premier terme. (0,5 pt)
 - Écrire u_n en fonction de n puis déduire la limite de la suite (u_n) . (0,5 pt)
 - Calculer la somme $S = u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_{2021}$. (0,25 pt)

Géométrie dans l'espace

Exercice 2 (3 points). Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère les deux points $A(1, -1, 1)$ et $B(5, 1, -3)$. Soit (S) la sphère de centre $\Omega(3, 0, -1)$ et de rayon $R = 3$, et (Δ) la droite passant par le point A et de vecteur directeur $\vec{u}(2, -2, 1)$.

- Calculer la distance ΩA . (0,25 pt)
 - Montrer que les droites (Δ) et (ΩA) sont perpendiculaires. (0,5 pt)
 - Déduire la position relative de la droite (Δ) et la sphère (S) . (0,25 pt)
- Soit le point $M_a(2a - 3, 3 - 2a, a - 1)$ où $a \in \mathbb{R}$, montrer que $\overrightarrow{AM_a} = (a - 2)\vec{u}$ et déduire que $M_a \in (\Delta)$ pour tout $a \in \mathbb{R}$. (0,5 pt)
- Vérifier que $2x - 2y + z - 9a + 13 = 0$ est une équation du plan (P_a) passant par M_a et perpendiculaire à la droite (Δ) . (0,5 pt)
 - Montrer que $d(\Omega, (P_a)) = |3a - 6|$. (0,5 pt)
 - Déterminer les deux valeurs de a pour lesquelles le plan (P_a) est tangent à la sphère (S) . (0,5 pt)

Nombres complexes

Exercice 3 (3 points). Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A , B et C d'affixes respectives $z_A = 1 + 5i$, $z_B = 1 - 5i$ et $z_C = 5 - 3i$.

- Déterminer le nombre complexe z_D affixe du point D milieu du segment $[AC]$. (0,25 pt)
- Soit h l'homothétie de centre A et de rapport $\frac{1}{2}$. Déterminer le nombre complexe z_E affixe du point E l'image de B par h . (0,5 pt)
- On considère la rotation R de centre C et d'angle $(-\frac{\pi}{2})$, déterminer l'image de B par R . (0,5 pt)
- Soit F le point d'affixe $z_F = -1 + i$.
 - Vérifier que $\frac{z_D - z_A}{z_F - z_A} \times \frac{z_F - z_E}{z_D - z_E} = -1$. (0,25 pt)
 - En déduire que $(\overrightarrow{AF}, \overrightarrow{AD}) + (\overrightarrow{ED}, \overrightarrow{EF}) \equiv \pi[2\pi]$. (0,5 pt)
 - Déterminer la forme trigonométrique du nombre $\frac{z_E - z_F}{z_A - z_F}$ et déduire la nature du triangle AEF . (0,5 pt)
 - Déduire que les points A , D , E et F appartiennent à un cercle dont on déterminera un diamètre. (0,5 pt)

Calcul des probabilités

Exercice 4 (3 points). Une urne contient trois boules blanches, quatre boules rouges et cinq boules vertes, indiscernables au toucher. On tire au hasard et simultanément trois boules de l'urne.

- On considère les événements suivants : A : « Obtenir exactement deux boules rouges » et B : « Obtenir exactement une boule verte ».
 - Montrer que $p(A) = \frac{12}{55}$ et $p(B) = \frac{21}{44}$. (0,75 pt)
 - Calculer $p(A / B)$: la probabilité de l'évènement A sachant que l'évènement B est réalisé. Les événements A et B sont-ils indépendants ? (0,75 pt)
- Soit la variable aléatoire X qui associe à chaque tirage le nombre de boules vertes tirées.
 - Déterminer la loi de probabilité de X . (1 pt)
 - Calculer la probabilité d'obtenir au moins deux boules vertes. (0,5 pt)

Problème d'analyse

Exercice 5 (8,5 points). Soit f la fonction numérique définie sur $[0, +\infty[$ par : $\begin{cases} f(x) = x^4(\ln x - 1)^2 & ; x > 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$ et (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 1 cm).

- Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ puis déterminer la branche infinie de (C) au voisinage de $+\infty$. (0,75 pt)
- Montrer que f est continue à droite en 0. (0,5 pt)
 - Étudier la dérivabilité de f à droite en 0 puis interpréter le résultat géométriquement. (0,5 pt)
- Montrer que $f'(x) = 2x^3(\ln x - 1)(2 \ln x - 1)$ pour tout x de l'intervalle $]0, +\infty[$. (0,75 pt)
 - Dresser le tableau de variations de f . (0,5 pt)
- Sachant que $f''(x) = 2x^2(6 \ln x - 5) \ln x$ pour tout x de l'intervalle $]0, +\infty[$, étudier le signe de $f''(x)$ sur $]0, +\infty[$. (0,5 pt)

- (b) Dédurre que la courbe (C) admet deux points d'inflexion dont on déterminera les abscisses. (0,5 pt)
5. (a) Construire la courbe (C) dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (on prend : $\sqrt{e} \approx 1,6$ et $e^2 \approx 7,2$). (1 pt)
(b) En utilisant la courbe (C) , déterminer le nombre de solutions de l'équation $x^2(\ln x - 1) = -1$. (0,5 pt)
6. On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = f(|x|)$.
(a) Montrer que la fonction g est paire. (0,5 pt)
(b) Construire (C_g) la courbe représentative de g dans le même repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$. (0,5 pt)
7. (a) On pose $I = \int_1^e x^4(\ln x - 1) dx$, en utilisant une intégration par parties, montrer que $I = \frac{6-e^5}{25}$. (0,5 pt)
(b) On considère la fonction h définie sur l'intervalle $]0, +\infty[$ par $h(x) = x^5(\ln x - 1)^2$. Vérifier que $h'(x) = 5f(x) + 2x^4(\ln x - 1)$. (0,5 pt)
(c) Dédurre que $\int_1^e f(x) dx = -\frac{1}{5} - \frac{2}{5}I$. (0,5 pt)
(d) Calculer l'aire du domaine délimité par la courbe (C) et l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$. (0,5 pt)