

# Corrigés — Géométrie analytique de l'espace

## Chapitre 13

### Solution 1.

- $3(x-1) - (y-2) + 2(z+1) = 0 \Leftrightarrow 3x - y + 2z + 1 = 0.$
- $x + y + z = 0.$
- $\overrightarrow{AB}(-2; 2; 1), \overrightarrow{AC}(-1; -1; 2).$  Normale  $\vec{n}(a; b; c) : \vec{n} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$  et  $\vec{n} \cdot \overrightarrow{AC} = 0.$   $-2a + 2b + c = 0$  et  $-a - b + 2c = 0.$  En posant  $c = 2 : -2a + 2b + 2 = 0$  et  $-a - b + 4 = 0.$  D'où  $b = a - 1$  et  $a + (a - 1) = 4,$  soit  $a = \frac{5}{2}, b = \frac{3}{2}, c = 2.$  Multiplier par 2 :  $(5; 3; 4).$  Plan :  $5(x-2) + 3(y-1) + 4z = 0,$  soit  $5x + 3y + 4z = 13.$

### Solution 2.

- $\begin{cases} x=1+t \\ y=t \\ z=2-t \end{cases}.$
- $\overrightarrow{AB}(3; -4; 4).$   $\begin{cases} x=-1+3t \\ y=3-4t \\ z=4t \end{cases}.$

### Solution 3.

- Directeurs  $(1; 2; 3)$  et  $(1; 2; 3) :$  identiques. Vérifier si confondues :  $A(0; 0; 0) \in D_2 ? (0, 0, 0) = (1 + s, 2 + 2s, 3 + 3s)$  donne  $s = -1, -1, -1.$  Cohérent. Confondues.
- Injecter :  $(t) + (-t) + 2 = 3 \Leftrightarrow 2 = 3.$  Impossible. **Parallèles** (disjointes).

### Solution 4.

- $d = |1 + 2 + 3 \frac{|}{\sqrt{3}}| = \frac{6}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}.$
- $d = |-6 \frac{|}{\sqrt{4+1+4}}| = \frac{6}{3} = 2.$

### Solution 5.

$(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = 16.$   $(5; -2; 3) : (4)^2 + 0 + 0 = 16 \checkmark.$  **Oui.**

### Solution 6.

$(x-2)^2 - 4 + (y+1)^2 - 1 + (z-3)^2 - 9 + 5 = 0,$  soit  $(x-2)^2 + (y+1)^2 + (z-3)^2 = 9.$   
Sphère : centre  $(2; -1; 3),$  rayon 3.

### Solution 7.

- Normale  $\vec{n}(bc; ac; ab)$  avec  $a = 1, b = 2, c = 3 : (6; 3; 2).$  Plan :  $6(x-1) + 3y + 2z = 0,$  soit  $6x + 3y + 2z = 6.$
- $d(O, P) = |-6 \frac{|}{\sqrt{36+9+4}}| = \frac{6}{7}.$

**Solution 8.**

1. Normaux  $(2; 1; -1)$  et  $(1; -1; 3)$  : non colinéaires (ex.  $2 \neq -1$ ). Sécants.

2. Poser  $z = t$  :  $2x + y = 4 + t$  et  $x - y = 1 - 3t$ . Sommer :  $3x = 5 - 2t$ ,  $x = \frac{5-2t}{3}$ . Puis  $y = x - 1 + 3t = \frac{2+7t}{3}$ . Paramétrique : 
$$\begin{cases} x = \frac{5-2t}{3} \\ y = \frac{2+7t}{3} \\ z = t \end{cases}$$

**Solution 9.**

Projeté  $H = B + s\vec{u}$  avec  $s = \frac{\overline{BA} \cdot \vec{u}}{\vec{u} \cdot \vec{u}}$ .  $\overline{BA}(3; 1; 2)$ ,  $\vec{u}(1; 0; 1)$ ,  $\vec{u} \cdot \vec{u} = 2$ .  $s = \frac{3+0+2}{2} = \frac{5}{2}$ .  $H = (\frac{5}{2}; 0; \frac{5}{2})$ .  $\overline{AH} = (-\frac{1}{2}; -1; \frac{1}{2})$ .  $AH = \sqrt{\frac{1}{4} + 1 + \frac{1}{4}} = \sqrt{\frac{3}{2}}$ .